

# درمالیفت



## Keratoline

کراتولاین یک لایه بردار آنتیمی است که با شکستن اتصالات سلولی موجب جدا شدن سلولهای سطحی ایدردم و بازسازی تجدید سلولهای پوست می‌گردد.

## روش مصرف:

دو بار در طی شبانه روز کرم ژل مالایفت فورت را بر روی مناطق تیره پوست مالیده و به آرامی ماساژ دهید. در طی روز حتماً از کرم ضد آفتاب با بیمار حقانی پالا استفاده نمایند.

## توجه:

دور از دسترس کودکان، نور مستقیم آفتاب و در مکان خشک و خنک نگهداری شود.

از تماس کرم با چشم ها پرهیز گردد. در صورت تماس، چشم ها را با آب فراوان شستشو دهید.

تلفن دفتر مرکزی:  
۰۴۴۰ ۱۸۶۳۱

لایه شاخی مجاری غدد چربی و درمان اسکار ناشی از آکنه می‌شود.

## Lumiskin

این ماده از طریق رسپتورهای آناتومیست عمل می‌کند. نکته مهم و دیدگاه جدید در این روش اینست که تیروزینیاز به طور مستقیم مهار نمی‌شود بلکه در فرم غیرفعال خود ثابت باقی می‌ماند و باعث مهار ملانین سازی می‌گردد.

## Azeloglycine

کملکلسی از آسید آرلنیک و اسید آمینه کلیلیسین بوده و با همان آتریم تیروزینیاز اسک. ها و آفریگی های سطح پوست را برطرف می‌کند.

## Licorce Extract

فلاآونوئیدهای موجود در عماره شیرین بیان باعث کاهش پیکماتاسیون می‌گرد و همچین با مهار آتریم تیروزینیاز منجر به کاهش ملانین سازی می‌شود.

## Niacinamide

نیاسینامید نوعی پیتامین ب ۳ و یک ماده چندکاره عالی است. این ماده از انتقال ملائکزورون از سلولهای ملانوسیت به کراتینوسيت ها جلوگیری کرده و باعث مهار پیکماتاسیون می‌شود. نیاسینامید ۴% به اندازه هیدرورکینون ۹۶% موثر بوده و علاوه بر آن عوارض جانبی ندارد.

## $\alpha$ -Hydroxy Acid

اسیدهای میوه با لایه برداری از سلولهای شاخی و مرده سطح پوست و بدون ایجاد پوسته پوسته شدن باعث افزایش روند نوسازی سلولهای پوست می‌گردد.

## ترکیبات موثر:

### Butyl Resorcinol

جدیدترین و قوی ترین ترکیب ضد لک در دنیا که با اتصال به کیرنشده های آتریم تیروزینیاز به صورت برگشت ناچایر مانع از تشکیل رنگدانه های پوستی می‌گردد. بوتیل رزورسینیول با اثر روش نکنندگی قوی خود، رفع کننده لک های ناشی از نورخوارشید، بارداری افزایش سن و جای زخم ها و جوش میگردد.

### Wonderlight

این ماده از گاهه رازک بدست می‌آید و باعث مهار سبیرهای منجر به تولید ملانین در ملانوسیتها و کراتینوسيتها می‌شود. اندراپلت با مهار سبیر GM-CSF سایتوکین در کراتینوسيتها و مسیر GSK-3 در ملانوسیتها باعث کاهش های پیریگانکاتاسیون ایجاد شده در اتر استرس، افزایش سن، لک های ناشی از التهاب و سلساساً می‌گردد.

### O.D.A.White

این ماده اکتادسین دی او نیک اسید می‌باشد که از تخمیر بیولوژیکی او ایش اسید بدست می‌آید. او دی ای و بیت باعث مهار تمام مسیرهای متاپولیک سیستمز ملانین از هسته ملانوسیت ها می‌شود و با کاهش سطح تیروزینیاز mRNA، تولید تیروزینیاز و ملانین کاهش می‌یابد.

### Encapsulite BHA

اسید سالیسیلیک ملایم پوست، کاهش سطح به لایه برداری ملایم پوست، کاهش سطح

لک و تیرگی پوست ناشی از آن و تاثیرات روانی که به دنبال دارد بکی از مشکلاتی است که امروزه بسیاری از افراد را درگیر کرده است. نور افتاب، بالارفتن سین، صرف بخری از داروهای، بارداری و تغیرات هورمونی عواملی هستند که در ایجاد و افزایش لک تاثیر عده ای دارند. در اثر برخورد اشعه مانوا، بدنخ نور خورشید به پوست، سلولهای ملانوسیت تیریک می‌شوند و با فعال کردن آتریم تیروزینیاز موجب ساخت ملانین می‌گردند. تولید بیش از مقدار طبیعی و تجمع ملانین، موجب ایجاد لک و تیرگی در پوست می‌شود.

شرکت کیمیا فارمد گستر پس از سالها تحقیق و کسب تجربه در زمینه فرمولاسیون های پیشرفته و با همکاری دو همکاری برگ فراسوی موفق به تولید کرم ژل روش نکنندگ قوی مالایفت فورت گردیده است.

## ویژگی های کرم ژل مالایفت فورت:

- ضد لک و روش نکنندگ پوست
- لایه برداری ملایم سلولهای تیره پوست
- جلوگیری از تشکیل مجدد لک ها و تیرگی های پوست
- کم کردن رفع سریع لک های مقاوم به درمان
- فاقد هیدرورکینون و پاران

## کرم ژل روش نکنندگ پوست

# MELALIFT forte

Depigmenting Cream Gel  
محصولات تخصصی مراقبت از پوست و مو